

WAARNEMINGSBLAD VOOR LIBELLEN

Waarnemingsomstandigheden

Vindplaats:

GPS-coördinaten

Datum:

Begintijdstip:

Eindtijdstip:

Waarnemer

Temperatuur: 15 tot 17°C 18 tot 20°C 21 tot 25°C 26 tot 30 °C

Bewolking: 0 tot 25 % 25 tot 50 % 50 tot 75%

Windkracht: 0B 1B 2B 3B 4B

Dit zijn de voor elke soort verwachte inlichtingen

Waargenomen: ja – neen (**Voeg een soort bij als die niet in de lijst staat**)

♂ / ♀ **onbepaald:** aantal volgens geslacht

Totaal aantal individuen: 1 – 2 tot 5 – 6 tot 20 – 21 tot 100 – 101 tot 500 – meer dan 500

Stadium: larve – exuvia – teneraal – imago – onbepaald

Gedrag: zittend – dood aangetroffen – tandem – wiel – eitjeslegend – ruiend – voorbijvliegend

Waarnemingen

De waarnemer moet bij elk bezoek het hele watervlak rondgaan en er de Libellen observeren op een ongeveer twee meter strook langs de oever, tot in het midden van het watervlak.

Perioden

Minimaal 1 keer in elk van de 3 perioden: 1 mei tot 15 juni – 16 juni tot 31 juli – 1 augustus tot 15 september.

Soort	Waargenomen	Aantal individuen	♂ / ♀/ind.	Stadium	Gedrag	Opmerking
<i>Calopteryxsplendens</i>						
<i>Chalcolestes viridis</i>						
<i>Sympecmafusca</i>						
<i>Ischnura elegans</i>						
<i>Ischnurapumilio</i>						
<i>Enallagmacyathigerum</i>						
<i>Coenagrionpuella</i>						
<i>Coenagrionscitulum</i>						
<i>Erythrommaviridulum</i>						
<i>Erythromma najas</i>						
<i>Erythrommalindenii</i>						
<i>Pyrrhosomanymphula</i>						
<i>Platycnemispennipes</i>						
<i>Aeshnamixta</i>						
<i>Aeshnaisoceles</i>						
<i>Aeshna grandis</i>						
<i>Aeshnacyanea</i>						
<i>Anax imperator</i>						
<i>Anaxparthenope</i>						
<i>Corduliaaenea</i>						
<i>Libellulaquadrimaculata</i>						
<i>Libelluladepressa</i>						
<i>Libellulafulva</i>						
<i>Orthetrumcancellatum</i>						
<i>Sympetrumdanae</i>						
<i>Sympetrumanguineum</i>						
<i>Sympetrumfonscolombii</i>						
<i>Sympetrumstriolatum</i>						
<i>Sympetrumvulgatum</i>						
<i>Crocothemis erythraea</i>						